



| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|--|---|---|---|-----------------------------|
| An Händen und Unterarmen dürfen während der Arbeit weder Schmuckstücke, Uhren noch Ringe getragen werden. Fingernägel müssen kurz und sauber sein. Nagellack und künstliche Fingernägel sind nicht gestattet. | | | | |
|  Hygienische Händedesinfektion | C 20 Hände + Haut Desinfektion 100 %, 30 Sek. Noro-Viren: 100 %, 30 Sek. | -2 Hübe aus Spender (3-6 ml) auf die trockenen Hände geben. -Gründlich auf allen Hand- und Fingerflächen, einschl. Handgelenke verreiben. -Während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten. -Bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen. | -Vor dem Anziehen/nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen -Vor Dienstbeginn, nach Pausen, Toilettenbesuch bzw. Dienstende -Nach Kontakt mit infektiösen/m Personen/Material -Nach Niesen/Husten/Naseputzen -Nach Beendigung von Reinigungs- oder Schmutzarbeiten | -Alle Mitarbeiter |
| Händereinigung | C 45 Waschlotion 100 % | -1 Hub aus Spender (2 ml) Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen. Gründlich mit kaltem Wasser abspülen. -Mit Einmalhandtuch sorgfältig trocknen. | -Bei Arbeitsbeginn und -ende -Nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung | -Alle Mitarbeiter |
| Händepflege | C 50 Pflegelotion 100 % | -Pflegelotion in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. | -Nach dem Waschen und Trocknen -Nach Arbeitsende | -Alle Mitarbeiter |
| Hautschutz | C 60 Hautschutzschaum 100 % | -Hautschutzschaum in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. | -Bei Bedarf -Vor Feuchtarbeiten -Vor dem Tragen von Handschuhen | -Alle Mitarbeiter |
| Auf spannungslosen Zustand der Geräte achten! | | | | |
|  Brutschrank, Inkubator | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -1 x halbjährlich -Nach Kontamination sofort | -Medizinisches Fachpersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
| Elektrische Geräte, Zentrifugen, Messgeräte, Funktionsgeneratoren etc. Spül- und Waschbecken, Armaturen, Druckminderer | B 15 Wischdesinfektion Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -1 x täglich nach Arbeitsende -Nach Kontamination sofort | -Laborpersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
| Arbeitsflächen, inkl. Sicherheitswerkbank | B 15 Wischdesinfektion Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -1 x täglich -Nach Kontamination sofort | -Laborpersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 40 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) Noro-Viren: 100 %, 1 Min. | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
| Mobiliar, Arbeits- und Systemtische, Ablageboards etc. | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Häufig und von wechselnden Personen benutztes Mobiliar: 1 x täglich -Nach Kontamination sofort | -Medizinisches Fachpersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 40 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) Noro-Viren: 100 %, 1 Min. | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
| Gefahrstoffschränke, Laugen- und Säureschränke Gesichtsschutz (Visier), Schutzbrillen | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -1 x täglich -Nach Kontamination sofort | -Medizinisches Fachpersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
| Behandlungnahe Flächen, z. B. Ablagefläche für Instrumente und Material | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach jeder Behandlung | -Medizinisches Fachpersonal |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Einrichtung: | Praxen und Labore | | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 11.10.2018 | Datum: | Datum: | Datum: |

| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|---|--|--|--|-----------------------------|
| Abfallbehälter, Entsorgungsboxen, Auffangwannen | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Nach jeder Entleerung | -Reinigungspersonal |
| Toiletten und sanitäre Einrichtungen, wie z. B. Waschbecken, Armaturen, Produkt- und Handtuchspender, Händetrockner | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -1 x täglich | -Reinigungspersonal |
|  Fußböden | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf | -Reinigungspersonal |
|  Allgemeine, chirurgische Instrumente | A 20 Instrumentendesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) 2 %, 30 Min. (Noro-Viren) | -Manuelle Instrumentenaufbereitung: Zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen und auf vollständige Benetzung achten -Einwirken lassen, ggf. nachreinigen und erneut einlegen -Gründlich mit Wasser abspülen, trocknen lassen -Ggf. Sterilisation zuführen | -Direkt nach Gebrauch | -Medizinisches Fachpersonal |
| Umgang mit Wäsche und Abfällen | | | | |
| Berufs-/Dienstkleidung | Wäscherei | -Getrennt von Straßenkleidern aufbewahren. -Desinfizierend waschen. -In Wäschesäcken/Transportwagen sammeln. -Nach Umgang mit kontaminierter Wäsche Händedesinfektion durchführen. | -Bei Bedarf -Mind. 2 x wöchentlich -Nach Kontamination sofort | -Alle Mitarbeiter |
| PSA - Persönliche Schutzausrüstung | Einmalhandschuhe und -schutzkittel, evtl. Mundschutz und Haube | -PSA so anlegen, dass Arbeitskleidung vollständig bedeckt ist. -Nach Benutzung in reißfeste Abfallsäcke abwerfen. -Über normalen Hausmüll entsorgen. -Als infektiösen Müll behandeln. | -Bei Bedarf -Vor direktem Kontakt mit potenziell erregertem Material -Wechsel der PSA bei Durchfeuchtung | -Alle Mitarbeiter |
| PSA - Persönliche Schutzausrüstung | Gesichtsschutz, Schutzbrille | -Bei jeder Tätigkeiten, die mit dem Verspritzen von Gefahrstoffen sowie potentiell infektiösem Material oder mit möglicher Aerosolbildung einhergehen. | -Bei Bedarf -Vor direktem Kontakt mit potenziell erregertem Material -Wechsel der PSA bei Durchfeuchtung | -Alle Mitarbeiter |
| Kontaminierte Abfälle: mikrobiologische Kulturen (Petrischalen, Objektträger, Abstrichwatteträger etc.) Scharfe, spitze Gegenstände (Einmalskalpelle oder -klingen etc.) | Entsorgung gemäß AS 18 02 02 | -Für alle Abfälle dieses Abfallschlüssels gilt: Unmittelbar am Ort ihres Anfallens sammeln. -In reißfesten, durchstichsicheren, feuchtigkeitsbeständigen, dichten und verschließbaren Behältnissen (z. B. bauartgeprüfte Gefahrgutverpackung) lagern. -Ohne Umfüllen oder Sortieren zur zentralen Sammelstelle befördern. -Kontamination der Außenseite der Sammelgefäße in jedem Falle vermeiden. -Abfälle in einer zugelassenen Anlage verbrennen. | -Sofort nach Gebrauch entsorgen | -Laborpersonal |
| Gefahrstoffe: Entsorgung gemäß Verordnung | | | | |

Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln mit geeigneten Schutzhandschuhen arbeiten.
 Dieser Plan ist eine Dienstanweisung und verliert bei dem Einsatz von nicht genannten Produkten seine Gültigkeit.
 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 C 20 - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.
 Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Str. 27, 70806 Kornwestheim.

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Einrichtung: | Praxen und Labore | | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 11.10.2018 | Datum: | Datum: | Datum: |