


| Bereich  | Produkt  | Vorgehensweise  | Häufigkeit   | Verantwortlich    |
|--|--|---|--|-------------------|
| <p><b>An Händen und Unterarmen dürfen während der Arbeit weder Schmuckstücke, Uhren noch Ringe getragen werden. Essen, Trinken und Rauchen ist nur in den dafür vorgesehenen Räumen gestattet! Wechsel von unreiner zu reiner Seite vermeiden!</b></p> |  |   |  |                   |
|  <b>Hygienische Händedesinfektion</b>  | <b>C 20 Hände + Haut Desinfektion</b><br>100 %, 30 Sek.<br>Noro-Viren: 100 %, 30 Sek.                              | -2 Hübe aus Spender (3-6 ml) auf die trockenen Hände geben.<br>-Gründlich auf allen Hand- und Fingerflächen, einschl. Handgelenke verreiben.<br>-Während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten.<br>-Bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen. | -Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen<br>-Vor Verlassen der unreinen Seite<br>-Vor dem Betreten der reinen Seite<br>-Nach dem Umgang mit infektiösem Waschgut<br>-Vor Verlassen des Arbeitsplatzes<br>-Vor Dienstbeginn, nach Pausen, Toilettenbesuch bzw. Dienstende<br>-Nach Beendigung von Reinigungs- oder Schmutzarbeiten | -Alle Mitarbeiter |
| <b>Händereinigung</b>  | <b>C 45 Waschlotion</b><br>100 %   | -1 Hub aus Spender (2 ml) Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen. Gründlich mit kaltem Wasser abspülen.<br>-Mit Einmalhandtuch sorgfältig trocknen.  | -Bei optischer Verschmutzung<br>-Bei Arbeitsbeginn und -ende   | -Alle Mitarbeiter |
| <b>Händepflege</b>   | <b>C 50 Pflegelotion</b><br>100 %  | -Pflegelotion in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.   | -Bei Bedarf<br>-Bei individuellem Bedürfnis<br>-Nach Arbeitsende   | -Alle Mitarbeiter |
| <b>Hautschutz</b>  | <b>C 60 Hautschutzschaum</b><br>100 %  | -Hautschutzschaum in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.   | -Bei Bedarf<br>-2 - 3 x täglich<br>-Vor dem Tragen von Handschuhen   | -Alle Mitarbeiter |
| <b>Schutzhandschuhe (Einmal-)</b>  | <b>Medizinische Einmalhandschuhe aus Vinyl, Nitril etc.</b><br>Möglichst puderfrei<br>Bedingt chemikalienbeständig | -Handschuhe über die trockenen Hände ziehen.<br>-Handschuhe kurz und gezielt tragen.  | -Bei Bedarf<br>-Bei Kontakt mit potenziell infektiösem Material, z. B. Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen<br>-Beim Öffnen von Schmutzwäschesäcken<br>-Bei der Bearbeitung von infektiösem Waschgut<br>-Bei kurzzeitigem Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln  | -Alle Mitarbeiter |
| <b>Schutzhandschuhe (Mehrweg-)</b>   | <b>Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Vinyl, Latex etc.</b>   | -Wie oben.<br>-Innenseite nach Benutzung möglichst desinfizieren und trocknen.<br>-Handschuhe nicht mit anderen Personen gemeinsam nutzen.<br>-Bei Arbeiten über Kopf Handschuhen umstülpen.  | -Bei Bedarf<br>-Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel  | -Alle Mitarbeiter |

Anforderungen an den Waschplatz: leicht erreichbar, mit fließend Warm- und Kaltwasser, Direktspender für hautschonende Waschlotion, Händedesinfektionsmittel, geeignete Hautpflegemittel und Einmalhandtücher sowie Abwurfbehälter für Einmalhandtücher. Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen.

C 20 - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Köhlumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Str. 27, 70806 Kornwestheim.

|                   |   |           |                |
|-------------------|---|-----------|----------------|
| Einrichtung:      | Muster-Hautschutzplan für die Wäscherei |           |                |
| Ersteller:        | Prüfung:                                | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 26.07.2017 | Datum:                                  | Datum:    | Datum:         |