





| Bereich   | Produkt  | Vorgehensweise   | Häufigkeit   | Verantwortlich    |
|---|--|--|--|-------------------|
|  <b>Hygienische Händedesinfektion</b> | <b>C 20 Hände + Haut Desinfektion</b><br>100 %, 30 Sek.<br>Noro-Viren: 100 %, 60 Sek.                              | -Präparat auf die trockenen Hände geben.<br>-Gründlich auf allen Hand- und Fingerflächen, einschl. Handgelenke verreiben.<br>-Während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten.<br>-Bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen. | -Bei Bedarf<br>-Nach Kontakt mit Gegenständen, die mit dem Verstorbenen in Berührung gekommen sind.<br>-Nach Kontakt mit Verstorbenen<br>-Vor dem Anziehen/nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen<br>-Vor Dienstbeginn, nach Pausen, Toilettenbesuch bzw. Dienstende<br>-Nach Kontakt mit infektiösen/m Personen/Material<br>-Nach Beendigung von Reinigungs- oder Schmutzarbeiten | -Alle Mitarbeiter |
|  <b>Händereinigung</b>                | <b>C 45 Waschlotion</b><br>100 %   | -Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen.<br>Gründlich mit kaltem Wasser abspülen.<br>-Mit Einmalhandtuch sorgfältig trocknen.   | -Bei Bedarf<br>-Bei Arbeitsbeginn und -ende<br>-Nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung  | -Alle Mitarbeiter |
|  <b>Händepflege</b>                   | <b>C 50 Pflegelotion</b><br>100 %  | -Pflegelotion in die sauberen, trockenen Hände einreiben.<br>Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.   | -Nach dem Waschen und Trocknen<br>-Bei individuellem Bedürfnis<br>-Nach Arbeitsende  | -Alle Mitarbeiter |
|  <b>Hautschutz</b>                    | <b>C 60 Hautschutzschaum</b><br>100 %  | -Hautschutzschaum in die sauberen, trockenen Hände einreiben.<br>Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.   | -Bei Bedarf<br>-2 - 3 x täglich<br>-Vor dem Tragen von Handschuhen   | -Alle Mitarbeiter |
| <b>Schutzhandschuhe (Einmal-)</b>   | <b>Medizinische Einmalhandschuhe aus Vinyl, Nitril etc.</b><br>Möglichst puderfrei<br>Bedingt chemikalienbeständig | -Handschuhe über die trockenen Hände ziehen.<br>-Handschuhe kurz und gezielt tragen.   | -Bei Bedarf<br>-Während den Tätigkeiten am Verstorbenen<br>-Beim Umgang mit gesundheitsgefährdenden Materialien<br>-Bei kurzzeitigem Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln   | -Alle Mitarbeiter |
| <b>Schutzhandschuhe (Mehrweg-)</b>  | <b>Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Vinyl, Latex etc.</b><br>Ggf. mit langen Stulpen                        | -Handschuhe über trockenen Hände ziehen.<br>-Handschuhe kurz und gezielt tragen.<br>-Ggf. Baumwollhandschuhe unterziehen, vor allem bei längeren Tragezeiten.<br>-Innenseite nach Benutzung möglichst desinfizieren und trocknen.<br>-Handschuhe nicht mit anderen Personen gemeinsam nutzen.            | -Bei Bedarf<br>-Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel  | -Alle Mitarbeiter |

Anforderungen an den Waschplatz: leicht erreichbar, mit fließend Warm- und Kaltwasser, Direktspender für hautschonende Waschlotion, Händedesinfektionsmittel, geeignete Hautpflegemittel und Einmalhandtücher sowie Abwurfbehälter für Einmalhandtücher.  
Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen.  
C 20 - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.  
Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Str. 27, 70806 Kornwestheim.

|                   |                       |               |                |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Einrichtung:      | Muster-Hautschutzplan | für Bestatter |                |
| Ersteller:        | Prüfung:              | Freigabe:     | Evaluation am: |
| Datum: 03.07.2020 | Datum:                | Datum:        | Datum:         |