


| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|---|---|--|--|-------------------|
|  Hygienische Händedesinfektion | C 20 Hände + Haut Desinfektion 100 %, 30 Sek. Noroviren: 100 %, 60 Sek. | -Präparat auf die trockenen Hände geben. -Gründlich auf allen Hand- und Fingerflächen, einschl. Handgelenke verreiben. -Während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten. -Bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen. | -Bei Bedarf -Vor/nach Kontakt mit Hotelgästen -Nach Verlassen des Hotelzimmers -Vor dem Anziehen/nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen -Vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. Nahrungsaufnahme -Vor Dienstbeginn, nach Pausen, Toilettenbesuch bzw. Dienstende -Nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (z. B. Blut) und Ausscheidungen (z. B. Erbrochenem) -Nach Niesen/Husten/Naseputzen -Nach Beendigung von Reinigungs- oder Schmutzarbeiten | -Alle Mitarbeiter |
| Händereinigung | C 45 Waschlotion 100 % | -Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen. Gründlich mit kaltem Wasser abspülen. -Mit Einmalhandtuch sorgfältig trocknen. | -Bei Bedarf -Nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung | -Alle Mitarbeiter |
| Händepflege | C 50 Pflegelotion 100 % | -Pflegelotion in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume und Nagelfalze beachten. | -Bei Bedarf -Bei individuellem Bedürfnis -Nach Arbeitsende | -Alle Mitarbeiter |
| Hautschutz | Hautschutzpräparat 100 % | -Hautschutzpräparat in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. | -2 - 3 x täglich -Vor Feuchtarbeiten -Vor dem Tragen von Handschuhen | -Alle Mitarbeiter |
|  Oberflächen und Einrichtungsgegenstände (z. B. Liegen, Tische, Stühle) | orochemie® Schonreiniger 25-50 ml/10 l Wasser Bei hartnäckiger Verschmutzung höhere Dosierung | -Mit geeignetem Tuch feucht wischen. | -Bei Bedarf | -Reinigungskräfte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion* 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Nach Kontamination sofort -Bei Infektionsgeschehen | -Wie oben |
| Häufige Kontaktflächen: Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter etc. | B 15 Wischdesinfektion* 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -1 x täglich | -Reinigungskräfte |
|  Toiletten und sanitäre Einrichtungen, wie z. B. Waschbecken, Armaturen, Produkt- und Handtuchspender, Händetrockner | orochemie® Sanitärreiniger eco 50-100 ml/10 l Wasser Bei hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt | -Mit geeignetem Tuch feucht wischen. | -Bei Bedarf -1 x täglich | -Reinigungskräfte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion* 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach Kontamination sofort | -Wie oben |
| Siehe Bereich darüber | B 40 Schnelldesinfektion* 100 %, 1 Min. (VAH) Noroviren: 100 %, 30 Sek. | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
|  Toiletten, Urinale, Bidets -außen- | orochemie® Sanitärreiniger eco 50-100 ml/10 l Wasser Bei hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt | -Mit geeignetem Tuch feucht wischen. | -Bei Bedarf -1 x täglich | -Reinigungskräfte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion* 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach Kontamination sofort | -Wie oben |
|  Toiletten, Urinale, Bidets -innen- | orochemie® WC-Reiniger Unverdünnt | -Unter den Rand des Beckens spritzen, einwirken lassen, mit Bürste reinigen und abspülen. | -Bei Bedarf -1 x täglich | -Reinigungskräfte |
|  Spiegel, Glas- und Fensterflächen | orochemie® Glasreiniger eco Unverdünnt | -Aufsprühen (3 x sprühen pro qm) und mit trockenem, fusselfreiem Tuch abwischen. | -Bei Bedarf | -Reinigungskräfte |

| | | | |
|-------------------|---|------------|----------------|
| Einrichtung: | Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan | für Hotels | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 24.11.2022 | Datum: | Datum: | Datum: |

| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|--|--|---|---|-------------------|
| Bade-, Duschwanne, Duschkabine | B 15 Wischdesinfektion* 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Bei Zimmerwechsel | -Reinigungskräfte |
| Abfallbehälter | B 15 Wischdesinfektion* 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach jeder Entleerung | -Reinigungskräfte |
|  Fußböden | orochemie® Schonreiniger 25-50 ml/10 l Wasser Bei hartnäckiger Verschmutzung höhere Dosierung | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode reinigen. | -Bei Bedarf -Bei Zimmerwechsel | -Reinigungskräfte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion* 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach Kontamination sofort -Bei Infektionsgeschehen | -Wie oben |

Bei der Anwendung von Reinigern mit anionischen Tensiden und Desinfektionsmitteln im Wechsel kann es zu Verminderung der Reinigungs- bzw. Desinfektionswirkung kommen. Daher ist im Zweifelsfall zwischen beiden Schritten zu wässern.

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Desinfektion und Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen.

Produkte vor dem Zugriff von unberechtigten Personen sicher aufbewahren.

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

C 20 - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Str. 27, 70806 Kornwestheim.

| | | | |
|-------------------|---|------------|----------------|
| Einrichtung: | Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan | für Hotels | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 24.11.2022 | Datum: | Datum: | Datum: |